

BESTUURSMEEDEDELINGEN

Bestuursleden:

Voorzitter: Jan Cuppen, Buurtmeesterweg 16,
6711 HM, Ede (08380-52039).

Penningmeester: Oscar Vorst, Poortstraat 55,
3572 HD, Utrecht (030-722209).

Coord. vergad.: Bas Drost, Lingedijk 35,
4014 MP, Wadenoijen (03446-1440).

Leden: Henk Pijpers, Goudsbloemlaan 63,
2565 CP, Den Haag (070-3602017).
Arno van Berge Henegouwen, Scheveningsebos 45,
2716 HV, Zoetermeer (079-211952)

VERENIGINGSNIEUWS

8-10 sept. Weekend-excursie naar Bakkeveen en omgeving.

29 sept-1 okt Excursie AG Rheinischer Koleopterologen naar de zuidelijke Eifel.

25 nov Workshop in Tilburg.

NIEUWE LEDEN

D.J. Ronhaar, Wilhelminastraat 27, 3911 MB Rhenen, tel. 08376-17817.

EXCURSIE BAKKEVEEN 8-10 SEPTEMBER 1995

Voor de aanstaande weekend-excursie is inmiddels een geschikt, doch eenvoudig onderkomen gevonden te Bakkeveen. Dit zal bestaan uit kampeerboerderij 'De Harmsdobbe' (Amersfoort coördinaten 214-566), alwaar we de beschikking hebben over twee slaapzaaltjes en een gemeenschappelijke ruimte. Een blik op de kaart doet vermoeden dat de omgeving rijkelijk bedeed is met pingo-ruïnes. Evenals vorig jaar zijn ook dit maal de collega's van de AG Rheinischer Koleopterologen uitgenodigd.

Uit betrouwbare bron is vernomen dat de omgeving waarlijk prachtig is. Het betreft een zeer afwisselend, oud cultuur-landschap met bossen en vennenrijke heide restanten. Kortom een Drents stukje Friesland. Komt dus allen.

Aanmelding, liefst zo spoedig mogelijk, door overmaking van fl. 70,- op giro 4058536 t.n.v. Sektie Everts, Utrecht. Deze prijs is exclusief het diner van zaterdagavond, dat traditioneel buiten de deur zal worden genuttigd.

Verslag van de excursie naar de Biesbosch, 10-12 september 1993

Aan de tweede weekend-excursie van de sektie namen 13 personen deel. De wilgenbossen, kreken, rietvelden en moerassige ruigten leverden het record-aantal van 292 soorten op. Hieronder bevinden zich een flink aantal soorten die het vermelden waard zijn.

Aan de oever van de Amer (bij het Gat van den Ham) werd een groot aantal exemplaren van *Dromius longiceps* verzameld door overjarige rietstengels open te peuteren. Naast deze zeldzame soort kwamen zo ook *Dromius linearis*, *Demetrius imperialis*, *D. monostigma* en *Odacantha melanura* tevoorschijn. Op de zelfde plek werd uit het aanspoelsel een exemplaar van de fraaie *Rugilus angustatus* gezeefd. Een zwart-bruine *Rugilus* met knalrood halsschild.

Een aantal andere soorten kwam in de Biesbosch opmerkelijk veelvuldig voor, o.a. *Ocys harpaloides* (12 exemplaren!), *Soronia grisea* en *Ochthebius bicolon*. Deze laatste soort werd op verscheidene plaatsen gezeefd uit de strooisellaag van de verruigde wilgenbossen. Op dezelfde manier werd op twee plaatsen een exemplaar van *Bryaxis clavicornis* gevangen. Deze zeer zeldzame pselaphide werd slechts enkele malen eerder in ons land verzameld, onder andere in de Sliedrechtse Biesbosch. Voor deze soort van rivierbegeleidende bossen vormt de Biesbosch dus een waar bolwerk.

In een holle knotwilg die, afgaande op de aanwezige keutels, waarschijnlijk bewoond werd door een bisamrat werden de volgende (nest)bewoners aangetroffen: *Nemadus colonoides*, *Stenichnus bicolor*, *Hypnogyra glaber*, *Crataraea suturalis* en *Haploglossa gentilis*.

De ware liefhebber zal het grote aantal halipliden niet ontgaan zijn: maar liefst negen soorten werden geteld, waaronder *Haliplus wehnckei*. Vermeldenswaard, tenslotte, is ook de vangst van de snuitkever *Datonychus angulosus* in de Polder Kindem. Deze soort zou op *Galeopsis* en *Stachys* leven.

O. Vorst, B. Drost, J.G.M. Cuppen, B.J. van Vondel, Th. Heijerman, J. Muilwijk en A.J.P.A. Teunissen

CARABIDAE

Carabus granulatus L.
Nebria brevicollis (F.)
Notiophilus substriatus Wtrh.
Loricera pilicornis (F.)
Bembidion tetracolum Say
Bembidion aeneum Germ.
Bembidion guttula (F.)
Ocys harpaloides (Serv.)
Asaphidion curtum (Heyd.)
Trichocellus placidus (Gyll.)
Pterostichus strenuus (Panz.)
Agonum moestum (Duft.)
Agonum micans (Nicol)
Agonum fuliginosum (Panz.)
Agonum pelidnum (Payk.)
Platynus assimilis (Payk.)

Platynus albipes (F.)
Amara similata (Gyll.)
Amara aulica (Panz.)
Badister lacertosus Sturm
Badister sodalis (Duft.)
Odacantha melanura (L.)
Demetrius monostigma Sam.
Demetrius imperialis (Germ.)
Dromius longiceps Dej.
Dromius linearis (Ol.)
Dromius quadrimaculatus (L.)
Dromius spilotus (Ill.)
Dromius sigma (Rossi)
Dromius melanocephalus Dej.

HYGROBIIDAE

Hygrobia hermanni (F.)

HALIPLIDAE

Peltodytes caesus (Duft.)
Haliplus lineatocollis (Marsh.)
Haliplus ruficollis (Geer)
Haliplus heydeni Wehncke
Haliplus fluviatilis Aubé
Haliplus wehnckei Gerh.
Haliplus immaculatus Gerh.
Haliplus laminatus (Schall.)
Haliplus flavicollis Sturm

NOTERIDAE

Noterus clavicornis (Geer)
Noterus crassicornis (Müll.)

DYTISCIDAE

Hyphydrus ovatus (L.)

- Guignotus pusillus* (F.)
Coel. impressopunctatus (Schl.)
Hygrotus versicolor (Schall.)
Hygrotus inaequalis (F.)
Hydroporus angustatus Sturm
Hydroporus palustris (L.)
Hydroporus incognitus Shp.
Hydroporus planus (F.)
Hydroporus nigrita (F.)
Graptodytes pictus (F.)
Laccophilus minutus (L.)
Laccophilus hyalinus (Geer)
Agabus bipustulatus (L.)
Agabus sturmi (Gyll.)
Agabus undulatus (Schrk.)
Ilybius ater (Geer)
Ilybius quadriguttatus (Lacord.)
Nartus grapei (Gyll.)
Rhantus suturalis (M'Leay)
Colymbetes fuscus (L.)
- HYDRAENIDAE**
Hydraena riparia Kug.
Ochthebius bicolon Germ.
Ochthebius minimus (F.)
Limnebius crinifer Rey
- HYDROPHILIDAE**
Helophorus aequalis Thoms.
Helophorus brevipalpis Bedel
Helophorus obscurus Muls.
Helophorus minutus F.
Coelostoma orbiculare (F.)
Cercyon melanocephalus (L.)
Cercyon tristis (Ill.)
Cercyon convexiusculus Steph.
Cercyon analis (Payk.)
Megasternum obscurum (Mrsh.)
Hydrobius fuscipes (L.)
Anacaena globulus (Payk.)
Anacaena limbata (F.)
Anacaena lutescens (Steph.)
Anacaena bipustulata (Marsh.)
Laccobius bipunctatus (F.)
Laccobius minutus (L.)
Helochares lividus (Forst.)
Helochares obscurus (Müll.)
Enochrus testaceus (F.)
Enochrus coarctatus (Gredl.)
Cymbiodyta marginella (F.)
Hydrochara caraboides (L.)
Hydrophilus piceus (L.)
- HISTERIDAE**
Carcinops pumilio (Er.)
- SILPHIDAE**
Phosphuga atrata (L.)
- CHOLEVIDAE**
Nemadus colonoides (Kr.)
Nargus velox (Spence)
Sciodrepoides watsoni (Spnce)
Catops coracinus Kelln.
Catops morio (F.)
- LEIODIDAE**
Agathidium varians (Beck)
Agathidium laevigatum Er.
- SCYDMAENIDAE**
Stenichnus bicolor Denny
- PTILIIDAE**
Ptenidium laevigatum Er.
Ptenidium intermedium Wank.
Ptenidium nitidum (Heer)
Acrotrichis atomaria (Geer)
Acrotrichis sitkaensis (Mtsch.)
- SCAPHIDIIDAE**
Scaphisoma agaricinum (L.)
Scaphisoma boleti (Panz.)
- STAPHYLINIDAE**
Phloeocharis subtilissima Mnnh.
Proteinus ovalis Steph.
Proteinus macropterus (Grav.)
Phyllodrepa ioptera (Steph.)
Omalius rivulare (Payk.)
Lesteva sicula heeri Fauv.
Carpelimus bilineatus (Steph.)
Carpelimus impressus Bsd.Lcld.
Carpelimus corticinus (Grav.)
Carpelimus elongatulus Er.
Thinodromus arcuatus (Steph.)
Oxytelus laqueatus (Marsh.)
Anotylus rugosus (F.)
Anotylus sculpturatus (Grav.)
Stenus junio (Payk.)
Stenus bimaculatus Gyll.
Stenus boops Ljungh.
Stenus pusillus Steph.
Stenus humilis Er.
Stenus carbonarius Gyll.
Stenus brunnipipes Steph.
- Stenus fulvicornis* Steph.
Stenus cicindeloides (Schall.)
Stenus palustris Er.
Euaesthetus bipunctatus (Ljungh.)
Euaesthetus ruficapillus Bsd.Ld.
Paederus riparius (L.)
Rugilus angustatus (Fourcr.)
Rugilus rufipes Germ.
Rugilus orbiculatus (Payk.)
Medon ripicola (Kr.)
Lathrobium quadratum (Payk.)
Lathrobium volgense Hochh.
Lathrobium brunnipipes (F.)
Gyrophynus angustatus Steph.
Xantholinus linearis (Ol.)
Xantholinus longiventris Heer
Hypnogyra glaber (Nordm.)
Gabrius osseticus (Kol.)
Gabrius splendidulus (Grav.)
Gabrius pennatus Shp.
Heterothops dissimilis (Grav.)
Quedius maurorufus (Grav.)
Quedius semiaeneus (Steph.)
Habrocerus capillaricornis (Gr.)
Sepedophilus testaceus (F.)
Sepedophilus immaculatus (St.)
Tachyporus obtusus (L.)
Tachyporus solutus Er.
Tachyporus hypnorum (F.)
Tachyporus dispar (Payk.)
Tachyporus atriceps Steph.
Tachinus signatus Grav.
Tachinus corticinus Grav.
Myllaena dubia (Grav.)
Myllaena intermedia Er.
Oligota pusillima (Grav.)
Gyrophana fasciata (Marsh.)
Gyrophana joyi Wendeler
Gnypeta carbonaria (Mannh.)
Dacrila fallax (Kr.)
Aloconota gregaria (Er.)
Amischa analis (Grav.)
Amischa soror (Kr.)
Amischa decipiens (Shp.)
Geostiba circellaris (Grav.)
Atheta malleus Joy
Atheta palustris (Kiesw.)
Atheta nigricornis (Thoms.)
Atheta harwoodi Will.
Atheta amicula (Steph.)
Atheta orphana (Er.)
Atheta orbata (Er.)
Atheta fungi (Grav.)

- Atheta nigra* (Kr.)
Atheta sordidula (Er.)
Atheta laticollis (Steph.)
Atheta crassicornis (F.)
Atheta atramentaria (Gyll.)
Atheta longicornis (Grav.)
Acrotona silvicola (Kr.)
Acrotona parvula (Mannh.)
Drusilla canaliculata (F.)
Meotica exilis (Er.)
Meotica capitalis Muls.Rey
Oxypoda elongatula Aubé
Oxypoda praecox Er.
Dexiogyia sp. Thoms.
Crataraea suturalis (Mannh.)
Haploglossa gentilis Märk.
Tinotus morion (Grav.)
Aleochara lanuginosa Grav.
- PSELAPHIDAE**
Bythinus macropalpus Aubé
Bryaxis bulbifer (Reichb.)
Bryaxis clavicornis (Panz.)
Brachygluta fossulata (Reichb.)
Pselaphus heisei Hbst.
- MALACHIIDAE**
Anthocomus coccineus (Schall.)
- CLAMBIDAE**
Clambus punctulum (Beck)
Clambus armadillo (Geer)
Clambus minutus (Sturm)
- SCIRTIDAE**
Cyphon coarctatus Payk.
Cyphon phragmiteticola Nyh.
Cyphon pubescens (F.)
Scirtes hemisphaericus (L.)
- DRYOPIDAE**
Dryops luridus (Er.)
- CERYLONIDAE**
Cerylon ferrugineum Steph.
- NITIDULIDAE**
Epuraea limbata (F.)
Soronia grisea (L.)
Glischrochilus hortensis (Frchr.)
- CUCUJIDAE**
Psammoecus bipunctatus (F.)
- CRYPTOPHAGIDAE**
Atomaria fuscata (Schönh.)
Atomaria mesomela (Hbst.)
Atomaria testacea Steph.
Ephistemus globulus (Payk.)
- PHALACRIDAE**
Olibrus aeneus (F.)
Stilbus testaceus (Panz.)
Stilbus oblongus (Er.)
- LATRIDIIDAE**
Enicmus transversus (Ol.)
Stephostethus lardarius (Geer)
Aridius bifasciatus (Rtt.)
Aridius nodifer (Westw.)
Corticaria gibbosa (Hbst.)
- MYCETOPHAGIDAE**
Mycetophagus multipunctatus F.
- CORYLOPHIDAE**
Corylophus cassidioides (Mrsh.)
- COCCINELLIDAE**
Coccidula rufa (Hbst.)
Rhyzobius litura (F.)
Rhyzobius chrysomeloides (H.)
Anisosticta 19-punctata (L.)
Propylaea 14-punctata (L.)
Psyllobora 22-punctata (L.)
- CISIDAE**
Ennearthron comutum (Gyll.)
- SALPINGIDAE**
Rhinosisimus planirostris (F.)
- TENEBRIONIDAE**
Scaphidema metallicum (F.)
- CHRYSOMELIDAE**
Oulema melanopus (L.)
Chrysolina graminis (L.)
Chrysolina polita (L.)
Plagioderma versicolora (Laich.)
Phyllotreta vittula (Redt.)
Phyllotreta striolata (F.)
Aphthona coerulea (Fourcr.)
Longitarsus rubiginosus (Fdr.)
Altica palustris Weise
Hippuriphila modeeri (L.)
Crepidodera aurata (Marsh.)
- Crepidodera plutus* (Latr.)
Epitrix pubescens (Koch)
Chaetocnema concinna (Marsh.)
Sphaeroderma testaceum (F.)
- APIONIDAE**
Acanephodes onopordi (Kirby)
Melanapion minimum (Hbst.)
Nanophyes marmoratus (Goeze)
- CURCULIONIDAE**
Phyllobius virideaeris (Laich.)
Sitona lineatus (L.)
Sitona lepidus Gyll.
Stenopelmus rufinatus Gyll.
Dorytomus longimanus (Forst.)
Dorytomus ictor (Hbst.)
Doryt. melanophthalmus (Payk.)
Notaris acridulus (L.)
Grypus equiseti (F.)
Tychius picirostris (F.)
Curculio crux F.
Pelenomus quadricorniger (Cln.)
Rhinoncus perpendicularis (Rc.)
Rhinoncus inconspicuum (Hbst.)
Rhinoncus pericarpus (L.)
Rhinoncus bruchoides (Hbst.)
Poophagus sisymbrii (F.)
Ceutorhynchus erysimi (F.)
Ceutorhynchus floralis (Payk.)
Parethelcus pollinarius (Forst.)
Datonychus angulosus (Boh.)
Daton. melanostictus (Marsh.)
Hadroplontus litura (F.)
Mogulones symphyti (Bedel)
Nedyus quadrimaculatus (L.)
Gymnetron villosulum Gyll.
Cionus tuberculatus (Scop.)
Rhynchaenus stigma (Germ.)
Rhynch. angustifrons (West)
Rhamphus pulicarius (Hbst.)